




» Never Stop Improving

## Stratégies pour optimiser la compétitivité des fermes

Soin hâtif du porcelet


# Trois éléments stratégiques

L'amélioration de la production et du coût de production



# Trois éléments stratégiques

L'amélioration de la production et du coût de production



# Soin hâtif du porcelet


## Commençons par la fin

- Le soin hâtif du porcelet– **commence avec la préparation de la salle de mise bas**
- N’oubliez pas quel est notre objectif pour sauver plus de porcelets – **Les cinq commandements**
- N’oubliez pas comment nous devons le faire– **Ce que la surveillance signifie vraiment**
- N’oubliez pas comment le faire à tous les jours– **Utilisation efficiente de la main d’œuvre**

# Préparation de la salle de mise bas

## Organisation et supervision


- L'ultime responsabilité est du **gestionnaire de lactation...**
- Mais c'est un travail de **toute l'équipe.**
- Partir « du bon pied » est fondamental.



# Soin hâtif du porcelet

## “Les cinq commandements”


- La différence entre les **fermes de haut niveau productif** et les autres, c'est qu'elles font les choses de base d'une façon extraordinairement bonne.
- La combinaison des cinq commandements est **fondamentale**.
- **L'absence d'un ou de plusieurs** est un problème important.



# Soin hâtif du porcelet

## Comment le faire?

- **L'assistance à la mise bas** se définit comme étant présent chaque 15-20 minutes pendant que la truie met bas, pour :
- **L'objectif** est de le faire à temps et correctement dans plus de 90% des portées quand nous sommes à la ferme.



# Soin hâtif du porcelet

Pourquoi cela ne fonctionne pas dans ma ferme?

**Le vrai défi** est de l'implanter de manière consistante :


- **Distribution de la main d'œuvre** – Les journées et les heures ne sont pas toujours pareilles
- **Qualité de la main d'œuvre** – Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour ce travail
- **Priorités** – Urgent vs. important

# Soin hâtif du porcelet

## Distribuer et prioriser la main d'œuvre

Le gestionnaire de la ferme et le gestionnaire de lactation sont une **pièce clé**

- **Reporter** des tâches urgentes équivaut à une plus haute mortalité.
- **Prioriser et planifier** à l'avance équivaut à sauver plus de porcelets.




# Soin hâtif du porcelet

## Deux premières heures de la journée

### Priorités :

- Identifier les truies à problèmes
- Sécher et réchauffer les porcelets
- Marquer les porcelets de taille petite / moyenne qui ont les ventres vides
- Entraînement à la tétine – accès rapide au colostrum



# Soin hâtif du porcelet

## Identifier les truies à problèmes

- Les identifier rapidement à la **première ronde**
- Fouiller s'il y a un mort-né
- Continuer à vérifier plus fréquemment



# Soin hâtif du porcelet

## Gestion efficace de l'aire de sécurité

- **Trop chaude**
- Augmenter la hauteur de la lampe
- Vérifier le comportement des porcs à la tournée suivante



# Soin hâtif du porcelet

## Gestion efficace de l'aire de sécurité

- **Trop froide**
- Baisser la lampe
- Vérifier le comportement des porcs à la tournée suivante
- Vérifier les diarrhées



# Soin hâtif du porcelet

Premières heures de la journée – prévenir le refroidissement


- Assécher tous les **porcs qui se trouvent humides**
- **Les garder secs**
- Marquer les **moyens / petits**
- Leur faire **boire du colostrum**



# Soin hâtif du porcelet

## Accès rapide au colostrum

- Identifier les porcs nés durant la nuit qui ont le **ventre vide**
- Les marquer
- Les mettre à la tétine
- Répéter jusqu'à ce qu'ils mangent par eux-mêmes



# Soin hâtif du porcelet

## Accès rapide au colostrum

### Identification visuelle

- Faire un suivi aux **20-30 min** des porcs qui sont marqués
- S'assurer qu'ils **savent** s'alimenter (entraînement à la tétine)
- S'assurer qu'ils aient **accès** à la tétine



# Soin hâtif du porcelet

## Accès rapide au colostrum

### Niveau de compétition à la tétine

- **Identifier** les situations quand les porcelets marqués n'ont pas d'accès à la tétine
- **Décider** quelle stratégie est la meilleure pour réduire la compétition à la tétine :
  - L'allaitement fractionné (split-suckling)
  - Adoption stratégique



# Soin hâtif du porcelet

## L'allaitement fractionné

- **C'est quoi** : un outil qui permet aux porcelets en désavantage de se nourrir avec plus de facilité durant 90 min. Comment ? En ôtant les 5-7 porcelets qui sont nés en premier et qui sont plus grands.
- **Ce n'est pas** – Une stratégie pour réduire la mortalité par soi-même
- L'allaitement fractionné sans un entraînement à la mamelle et sans un suivi visuel, est un travail incomplet



# Soin hâtif du porcelet

## L'allaitement fractionné

N'est pas nécessaire pour 100% des portées, se focaliser sur :

- **Les grandes portées** – Plus de porcelets que de tétines fonctionnelles
- Portées d'une **grandeur inégale** à la naissance où les petits et moyens sont en désavantage.
- Truies avec une **mauvaise qualité de mamelles** (mauvaise exposition des lignes mammaires, mastite, tétines de mauvaise grandeur, truies trop âgées).

# Soin hâtif du porcelet

## L'allaitement fractionné

### Erreurs plus courantes :

- Ne pas placer dans les bacs chauds les porcelets adéquats, comme ceux avec le **ventre vide, qui sont petits ou humides.**
- Durée: Trop longue ou courte. Ce qui est recommandé est entre 60-90 minutes.
- Ne pas placer les porcelets que nous sortons sous une source de chaleur.
- Laisser seulement 4-6 petits porcelets avec la truie pendant la mise bas, ce qui diminue la stimulation et libération naturelle d'ocytocine. Garder au moins huit porcelets.
- Faire l'adoption trop tard, après avoir fini l'allaitement fractionné.

# Soin hâtif du porcelet

## L'adoption

- **C'est quoi** : Un outil pour que tous les porcelets aient une tétine fonctionnelle pour se nourrir.
- **Ce n'est pas** – un outil pour égaliser la taille des porcelets
- **Les garder avec la mamelle adéquate**



# Soin hâtif du porcelet

## L'adoption

### Erreurs plus courantes :

- Déplacer les porcelets qui n'ont pas bu de colostrum – **Ventres vides.**
- Laisser les **petits porcelets** avec les vieilles truies / mamelles de mauvaise qualité.
- **Ne pas compter** les tétines fonctionnelles
- Déplacer une **quantité massive** de porcelets. Essayer toujours de garder l'intégrité de la portée originale.
- Adoption **une fois par jour**, à la fin de la journée, ou après 24h.

# Soin hâtif du porcelet

## L'adoption

### Recommandations de base:

- **Compter et noter** les tétines fonctionnelles sur la carte de parité
- Doit se faire le plus tôt possible durant les premières 12-18h, juste après **l'ingestion du colostrum (ventres pleins)**
- **Deux fois** par jour et limiter les déplacements :
  - Mises bas de la nuit – les deux premières heures du jour.
  - Mises bas du jour – les deux dernières heures du jour

# Soin hâtif du porcelet

## Résumé

- Le soin hâtif du porcelet – **Commence avec la préparation de la salle de mise bas.**
- N’oubliez pas quel est notre objectif pour sauver plus de porcelets – **Les cinq commandements.**
- N’oubliez pas comment nous devons le faire – **Ce que signifie réellement la surveillance.**
- N’oubliez pas comment le faire à tous les jours – **Utilisation efficace de la main d’œuvre.**